

## Majna obecná (*Acridotheres tristis*)

**Synonyma:** *Paradisea tristis*

**Anglické jméno:** Common myna, Indian myna, mynah

**Čeleď:** *Sturnidae*



Obr. 1 Majna obecná. Foto: K. W. Bridges

**Původ:** Oblast od východního pobřeží Kaspického moře, přes Indický subkontinent a jižní podúří Himálaje až po kontinentální jihovýchodní Asii (Thajsko, Vietnam).

**Sekundární rozšíření:** Introdukována do JV USA (Florida), do východní části jižní Afriky, jižní a JV Austrálie, Nový Zéland, do řady míst v Asii a Rusku (izolované hnízdní populace i okolo Moskvy) a na řadu oceánských ostrovů (např. Tenerife, Sv. Helena, Havaj, Madagaskar, Seychely, Maledivy). V evropských zemích se jedná o ojedinělé úniky z chovů.



Obr. 2 Majna obecná v Evropě (<http://alien.jrc.ec.europa.eu/SpeciesMapper>)

**Rozšíření v ČR:** Druh není přítomen na území ČR.

**Cesty zavlečení:** Úniky ze zajetí (např. populace v sev. Francii – Dunkerque), jinde dříve vysazována jako prostředek biologického boje proti hmyzu.

**Popis:** Poměrně robustní (25 cm, 80 - 140g) špačkovitý pták. Výrazně žlutý silný zobák a typický lem kolem oka, hlava leskle černá, tělo hnědé (na hrudi světlejší), křídla s bílým lemem v oblasti ručních krovek. Ocas svrchu hnědočerný, špičky ocasních per a spodek ocasu bílé barvy, stejně jako spodní část břicha. Nohy dlouhé a nápadně žluté. Pohlaví barevně neodlišena, samice jsou o něco menší. Poměrně hlučný druh, s variací zvuků, napodobuje i zvuky jiných druhů ptáků či lidská slova (proto v Indii chován jako analogie papoušů). Sídlí v otevřené krajině, v místech introdukce zejména v sídlech a jejich okolí. Všežravec, většina potravy je hmyz, dále jiné bezobratlé, vejce a ptačí mláďata menších druhů ptáků, žáby, ryby ve vysychajících nádržích, drobné ještěrky a hlodavce. Z rostlinné stravy převládají semena a ovoce planě rostoucích i člověkem pěstovaných rostlin.



Obr. 3 Typický žlutý lem kolem oka  
Foto: K. W. Bridges



Obr. 4 Typické zbarvení vajíček  
Foto: Syed Abid Hussain

Monogamní, žijí v páru po celý život. Hnízdění individuální, nejčastěji v dutinách stromů či skalních štěrbinách, ve městech si nachází rozličné úkryty v okapech, větracích otvorech, na pouličních lampách či nepoužívaných strojích. Snáší 4 – 5 světlě modrých vajec, na hnízdě se střídají oba rodiče, mláďata se líhnou po 13 až 18 dnech.

**Možnosti záměny:** Nejpodobnější jsou další zástupci rodu *Acridotheres*. Například majna velká (*A. grandis*), s malou chocholkou na čele, má tělo černé krom bílého zrcátka na křídlech a chybí jí žlutý lem kolem oka. Majna chocholatá (*A. cristatellus*) je velmi podobná m. velké, má ale bílý zobák. Velmi podobná je majna jávská (*A. javanicus*), která ale nemá kolem oka žlutý lem a její tělo je místo hnědé barvy šedé.

Majna žlutolící (*A. dumontii*) má kolem oka mnohem větší kruhovitou žlutou skvrnu. Známější špačkovitý zástupce loskuták posvátný (*Gracula religiosa*) má silnější oranžový zobák a na lících a týlu má nápadné žluté laloky. Jeho tělo je celé černé s výjimkou bílého zrcátka na křídlech. Stejně takto popsané znaky vykazují i ostatní druhy rodu loskuták.



Obr. 5 Majna jávská  
Foto: Lars Petersson



Obr. 6 Loskuták posvátný  
Foto: <http://natureconservation.in>

**Riziko:** IUCN zařadila majnu mezi 100 nejhorších invazních druhů. Početné populace v blízkosti člověka jsou nepříjemně hlučné, znečišťují okolí trusem. V agrárních oblastech mohou obdobně jako příbuzní špačci působit škodu na plodinách (víno, arašíd, obilniny). Pro autochtonní ornitofaunu představují potravní a hnízdní konkurenci – jsou dosti agresivní vůči ostatním druhům. Živí se i ptačími mláďaty jiných druhů, omezuje tedy početnost populací některých druhů ptáků (rybáci, buňáci, lokální druhy na malých ostrovech). Hostitelé některých parazitů (výtrusovec *Haemoproteus* způsobující ptačí malárii, či samotný „malarický“ rod *Plasmodium*). Majna na Havaji a Seychelách napomáhá šíření nepůvodní (středoamerické) libory měnlivé (*Lantana camara*), na některých tichomořských ostrovech pak šíření nepůvodní tykvovité rostliny *Coccinia grandis*.

**Likvidace:** Početnost lze omezovat likvidací hnízd či přímým odchycem do pastí. S jejich konstrukcí a používáním mají velké zkušenosti v jihovýchodní Austrálii. Podrobné návody na sestavení a aplikaci tzv. „PeeGee traps“ lze stáhnout na tomto odkazu: <https://richmondvalley.nsw.gov.au/wp-content/uploads/2020/01/Indian-Myna-Bird-Trap-Plan.pdf>. Majny jsou nicméně velmi inteligentní ptáci a dovedou se rychle naučit a rozpoznat možné nástrahy.

#### Zdroje:

Del Hoyo J., Elliott A., Christie D.A. (eds.) 2009. Handbook of the Birds of the World, Vol. 14, Bush-shrikes to Old World Sparrows, Lynx Edicions, Barcelona, 893 pp.  
Diquelou M.C., Griffin A.S. 2019. It's a trap! Invasive common mynas learn socially about control-related cues. Behavioral Ecology 30 (5): 1314 – 1323.

Lowe K.A., Taylor C.E., Major R.E. 2011. Do Common Mynas significantly compete with native birds in urban environments? *Journal of Ornithology* 152 (4): 909 – 921.

<https://www.cabi.org/isc/datasheet/2994>

<https://www.pestsmart.org.au/common-indian-myna-website/>

<http://www.iucngisd.org/gisd/species.php?sc=108>

**Citace:** Görner T. 2026. Majna obecná (*Acridotheres tristis*), informační karta, AOPK ČR Praha.

Dostupné na: <https://invaznidruhy.aopk.gov.cz/invazni-druhy-z-unijniho-seznamu>